

# Használati útmutató

## CARREVIR® ORRSPRAY

### Milyen típusú készítmény a CARREVIR® orrspray?

A Carrevir vírus okozta influenzaszerű megbetegedések megelőzésének illetve kezelésének támogatására ajánlott. Emellett a Carrevir az ornyálkahártya kiszáradásának megelőzésére illetve fenntartó nedvesítésére is alkalmazható. Használata felnőttek és egy éven felüli gyermekek számára javasolt.

A Carrevir **tartósítószer-mentes** készítmény. Steril szűrő biztosítja az oldat tisztaságát még többszöri használat után is.

### Mit tartalmaz a CARREVIR® orrspray?

A Carrevir orrspray átlátszó, színtelen, viszkózus (sűrűn folyós), szagtalan oldat.

Összetétel (1 ml oldat): 1,2 mg jóda-karragén (Carragelose®), 0,4 mg kappakarragén, nátrium-klorid, tisztított víz.

### Mi jellemzi a CARREVIR® orrspray-t?

A megfázást és az influenzaszerű megbetegedéseket kiváltó vírusok leggyakrabban az orrüregben keresztül fertőznek. Az influenzaszerű megbetegedéseket vírusok okozzák, mint például a rinovírus és a koronavírus. Ha ezek a vírusok bejutnak az orrüregbe, megtapadnak a nyálkahártyán és megfertőzik a nyálkahártya sejtjeit, ahol szaporodnak és elterjednek. Ez pedig a szokásos megfázásos tüneteket eredményezi: orrdugulás vagy orrfolyás, torokfájás és/vagy fejfájás, köhögés stb.

A betegség kezdeti fázisában gyakran nehéz biztonsággal különbséget tenni a megfázás és az influenza között. Ez utóbbi akár súlyos megbetegedést is okozhat, ezért a pontos diagnózis felállításához kérjen orvosi segítséget.

Az alacsony páratartalom és a szennyezett levegő az ornyálkahártya kiszáradását okozhatja. Az orr viszont csak akkor képes ellátni szűrő feladatát, ha az ornyálkahártya kellően nedves. A Carrevir orrspray egy védő nedvesítő filmréteget képez az ornyálkahártyán. Ez a folyékony filmréteg fizikai akadályt képez a külső behatásokkal szemben. A nedvesség fenntartása védelmet jelenthet a náthavírusok által okozott megfázás és egyéb influenzaszerű megbetegedések ellen.

A Carrevir Carragelose®-t, tengeri vörös algából nyert hatóanyagot tartalmaz. A Carragelose® kettős hatással rendelkezik:

- A Carrevir egy védő bevonatot képez a megfázást okozó vírusok ellen. Közönséges megfázást és influenzaszerű megbetegedéseket számos vírus okozhat, mint például a rinovírus és a koronavírus. A Carragelose® válogatás nélkül beburkolja a megfázást okozó vírusokat, így megakadályozza azok nyálkahártyához történő tapadását. Ezáltal csökkenti a légutak fertőzéséért felelős vírusok szaporodását és terjedését.
- A Carrevir orrspray egy védő nedvesítő filmréteget képez az ornyálkahártyán. A Carragelose® hatásának köszönhetően ez a filmréteg hosszú ideig megmarad az orr nyálkahártyáján és fizikai akadályt képez a külső behatásokkal szemben. Ez a nedves filmréteg támogatja a szervezet természetes védekezését a náthavírusok ellen.

### Alkalmazási területek – mikor ajánlott a CARREVIR® orrspray használata?

A Carrevir vírus okozta légúti fertőzések megelőzésére illetve támogató kezelésére ajánlott.

**A Carrevir orrspray lerövidíti az influenzaszerű megbetegedések lefolyási idejét és enyhíti a megfázásos tünetek súlyosságát. A Carrevir csökkenti az új fertőzések kialakulását, valamint a vírus okozta megfázásos tünetek kiújulását.**

Emellett a Carrevir az ornyálkahártya kiszáradásának megelőzésére illetve fenntartó nedvesítésére, ezáltal a száraz vagy irritált ornyálkahártya okozta panaszok megelőzésére és támogató kezelésre is alkalmazható.

### Adagolás és az alkalmazás módja

#### Hogyan és milyen gyakran kell alkalmazni a CARREVIR® orrspray-t?

A megfázás első tüneteinek (pl.: torokfájás, orrvizketés vagy orrfolyás stb.) megjelenésekor legalább napi három befújás javasolt orrnyílásonként. A kezelést a megfázás első tüneteinek megjelenése után a lehető

leghamarabb el kell kezdeni és a tünetek csillapodásáig javasolt folytatni. Amennyiben a panaszok egy hét után sem enyhülnek, illetve láz esetén forduljon orvoshoz.

Az ornyálkahártya nedvesen tartásához napi néhány befújás javasolt, az egyedi igényeknek megfelelően.



- A készítmény első alkalmazása előtt vegye le a védőkupakot és szükség szerint nyomja le többször az adagolópumpát, amíg egyenletes permet nem távozik belőle. Ezt követően a Carrevir orrspray készen áll a használatra.
- A sérülések megelőzése érdekében az adagolópumpát óvatosan vezesse az orrüregbe. Használat közben a tartályt tartsa függőlegesen.
- Használat után helyezze vissza a védőkupakot az adagolópumpára.

### **Mikor NE alkalmazza a CARREVIR® orrspray-t?**

Amennyiben ismert túlérzékenysége van a készítmény bármely összetevőjére.

### **Lehetséges mellékhatások**

Ez idáig a nagyon ritkán előforduló túlérzékenységi reakciókon kívül a készítmény egyéb mellékhatásai nem ismertek.

Gyógyszerkölsönhatások nem ismertek.

Egyéb készítményekkel történő kölcsönhatásokra vonatkozó vizsgálatokat nem végeztek.

### **Különleges figyelmeztetések**

A Carrevir helyileg fejti ki hatását, a Carragelose® nem szívódik fel a garat nyálkahártyáján keresztül.

A Carrevir orrspray terhesség és szoptatás alatt is használható.

A tünetek további fennállása esetén mindenképpen keresse fel orvosát.

Higiéniai okokból, illetve a fertőzések terjedésének elkerülése érdekében egyazon orrspray tartályt mindig csak egy és ugyanaz a személy használja.

A készítmény gyermekektől elzárva tartandó!

### **További információk**

A Carrevir orrspray hosszabb ideig is használható. Nem áll fenn a függőség vagy a túladagolás kockázata.

A Carrevir természetes összetevője a Carragelose®.

A Carrevir klinikailag vizsgált orvostechnikai eszköz/gyógyászati segédeszköz.


A Carrevir nem tartalmaz fájdalomcsillapítót/érzéstelenítőt, tartósítószert, állati eredetű összetevőt vagy üveg-házhatású gázokat.

A Carrevir laktóz- és gluténmentes, cukorbetegnek és vegánok is használhatják.



**Csomagolás:** 20 ml oldat adagolópumpával ellátott üvegtartályban, 1 befújás = 0,14 ml oldat (összesen 142 befújás).

**Eltarthatóság:** 36 hónap

A különleges szűrőrendszernek köszönhetően az oldat többszöri használat után is megőrzi sterilitását.

A dobozon feltüntetett lejárati idő (  ) után ne alkalmazza a készítményt. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

### **Tárolási előírás:**

 fénytől védve,  5°C és 30°C között tárolandó.

 **Gyártó:** Hälsa Pharma GmbH, Maria-Goeppert-Strasse 5, D-23562 Lübeck, Németország

**Forgalmazó:** Sager Pharma Kft., 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

A használati útmutató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2017. október

CE 0482

STERILE A